

EQUIPE
Dr.A. Cutrupi

Dr.ssa G. Di Napoli

Dr.M. Barbalace

NUMERI UTILI:

TEL:031.973.200-311 centralino

Sala Operatoria

Caposalta: Sig Ra Agata 031.973326

segreteria@casadicuralebetulle.it

ISTRUZIONI POST OPERATORIE PER I GENITORI

CIRCONCISIONE - PLASTICA DORSALE DEL PREPUZIO

- I. Attività: Restringere o limitare l'attività del vostro piccolo sarà impresa abbastanza difficile, pertanto cercate di evitare colpi durante lo spostamento o il piccolo trasporto (passeggini-ovetti auto).
- II. Dieta: Potrete dare liberamente da mangiare quello che desidera, una volta ripreso completamente dall'anestesia, ove non sussista vomito o nausea. Cominciate pure a dare da bere a piccoli sorsi e poi alimentatelo.
- III. Medicazione: Normalmente troverete una medicazione "a margherita" che contorna la base del pene sino alla punta del glande, non rimuovetela se non al domicilio e dopo 48 ore dall'intervento. Per il momento applicate abbondante pomata come GENTALYN UNGUENTO 2 volte al dì e soprattutto una volta rimossa la medicazione, con in alternativa una pomata come vaselina bianca, applicandola bene attorno ai punti anche 4 volte al giorno.
- IV. Farmaci: se non istruiti altrimenti è possibile che vostro figlio abbia bisogno di assumere farmaci antidolorifici o antinfiammatori come Paracetamolo o Ibuprofene o Paracetamolo+Codeina in supposta o per bocca alla dose pro kg/età ogni 6-8 ore.
- V. Bagno: eseguire sino a medicazione rimossa delle semplici spugnature, rimossa la medicazione anche nella vasca da bagno con un bagnetto rapido di non più di 5-10 minuti, poi liberamente come più gli piace, ma almeno dopo una settimana dall'intervento.


Restrizioni:

- Infanti: attenzione al trasporto
- Età Prescolare: non giochi di contatto, arrampicata o tricicli.
- Età Scolare: non attività strenua, non sport, non biciclette

Tutte le restrizioni s'intendono per tre settimane dall'intervento.

CHIAMATE IL MEDICO SE:

- Febbre ($> 38.5^{\circ}\text{C}$) che non diminuisce con la normale terapia.
- Arrossamento, gonfiore o dolore e qualche goccia di sangue sono del tutto normali nelle prime settimane.
- Secrezioni attorno alle linee di sutura
- Vomito
- Sanguinamento che non si ferma da solo.



Plastica del prepuzio

Qui non troverete delle particolari medicazioni, ma eseguite lo stesso la retrazione completa del prepuzio già a partire da stasera, e applicate abbondante pomata Gentalyn unguento , due volte al giorno per sette giorni.

Valgono ovviamente anche per questo intervento tutte le indicazioni da seguire nel post operatorio.

Cordiali saluti